



我国的《职业病分类和目录》（国卫疾控发〔2013〕48号）把布鲁氏菌病列为法定的职业病。



布鲁氏菌病有什么特点呢？

初期症状与感冒相似，容易误诊，急性期只要使用抗生素就能痊愈，而一旦错过急性期的治疗，布病转入慢性期后便很难治愈。



怎么才能判断自己是不是得了职业性布鲁氏菌病？

职业性布鲁氏菌病发生发展比较复杂，临床表现多样，应当结合以下内容综合性判断：

职业接触布鲁氏菌病的经历是指从事兽医、畜牧、屠宰、肉食品加工、皮毛加工、疫苗和诊断制品生产及从事布鲁氏菌防治等工作的人员。



临床表现出现**持续数日至数周发热（包括低热）**，**多汗、乏力、肌肉和关节疼痛等**。多数患者淋巴结、肝、脾和睾丸肿大，少数患者可出现各种各样的充血性皮疹和黄疸；慢性期患者多表现为骨关节系统损害；



特异性实验室检查结果阳性
初筛：平板凝集试验（PAT）或虎红平板凝集试验（RBPT）、皮肤过敏试验
血清学试验：试管凝集试验、补体结合试验、环状沉淀试验的任何一项为阳性
分离细菌：从病人血液、骨髓、其他体液及排泄物等任一种培养物中分离到布鲁氏菌



排除其他原因所致的类似疾病
应当排除风湿热、伤寒、副伤寒、肺或淋巴结核、风湿性关节炎等



职业接触布鲁氏菌病需要隔离吗？还能从事原工作吗？

职业接触布鲁氏菌病不需要隔离，现在还没有发现可能通过病人传播疾病。痊愈后可从事原工作。

